

## Standort halbschattig/ schattig

### Aster divaricatus – Weiße Sommer-Wald-Aster

**Blütenfarbe** weiß

**Blütezeit** August bis September

**Höhe** 50 cm – 70 cm

**Pflanzenabstand** 60 cm

**Pflanzenstandort** halbschattig Beet mit Wildstaudencharakter auf trockenem Boden.

**Pflege** Äußerst reichblütig, sehr gute Schmuckwirkung, kein Rückschnitt notwendig.

**Insekten** Insektenweide und bienenfreundlich

### Geranium sanguineum – Blut-Storchschnabel

**Blütenfarbe** karminrot

**Blütezeit** Juni bis August

**Höhe** 30 - 40 cm

**Pflanzenabstand** 35 cm

**Pflanzenstandort** halbschattig Beet mit Wildstaudencharakter auf trockenem Boden.

**Pflege** Storchschnabel ist wüchsig, robust, wenig anspruchsvoll und unempfindlich gegenüber Schnecken oder anderen Schädlingen. Durch das tief gehende Wurzelwerk vertragen der Blut-Storchschnabel und seine im Wuchs teils sehr unterschiedlichen Sorten viel Trockenheit.

**Insekten** Insektenweide und bienenfreundlich, heimische Wildstaude.

### Aquilegia vulgaris – Gewöhnliche Akelei

**Blütenfarbe** purpurrosa

**Blütezeit** Mai bis Juni

**Höhe** 50 cm - 60 cm

**Pflanzenabstand** 30 cm

**Pflanzenstandort** halbschattig Beet mit Wildstaudencharakter im trockenen bis frischen Boden.

**Pflege** Bei Akelei ist ein Rückschnitt nach der Blüte zwingend notwendig, wenn man unerwünschte Sämlinge vermeiden möchte.

**Insekten** Insektenweide und bienenfreundlich, heimische Wildstaude.

### Aruncus dioicus – Wald-Geißbart

**Blütenfarbe** weiß

**Blütezeit** Juni bis Juli

**Höhe** 100 cm - 180 cm

**Pflanzenabstand** 100 cm

**Pflanzenstandort** halbschattig/ schattig Beet mit Wildstaudencharakter im trockenen bis frischen Boden.

**Pflege** Für gelegentliche Düngergaben übers Jahr verteilt ist der Geißbart dankbar, am einfachsten geht das mit einer Mulchschicht aus Kompost im Herbst. Da die Fruchtstände oft den ganzen Winter über zierend sind, empfiehlt sich ein Rückschnitt im Frühjahr vor dem Neuaustrieb. Wer Selbstaussaat verhindern will, muss auf diesen Aspekt verzichten und die Blütenstände rechtzeitig nach dem Abblühen entfernen.

**Insekten** bienenfreundlich, heimische Wildstaude.

**Carex pendula – Hängende Segge**

**Blütenfarbe** bräunlich

**Blütezeit** Juni bis Juli

**Höhe** 50 cm - 120 cm

**Pflanzabstand** 80 cm

**Pflanzstandort** halbschattig/ schattig Beet mit Wildstaudencharakter auf frischem Boden.

**Pflege** Die Blüten hängen pendelnd an langen Halmen, sollten jedoch vor der Samenreife entfernt werden, um unerwünschte Ausbreitung zu verhindern.

**Insekten** bienenfreundlich, heimische Wildstaude.

**Polygonatum multiflorum – Salomonssiegel**

**Blütenfarbe** weiß

**Blütezeit** Mai bis Juni

**Höhe** 50 cm - 60 cm

**Pflanzabstand** 30 cm

**Pflanzstandort** halbschattig/ schattig Beet mit Wildstaudencharakter auf frischem Boden.

**Pflege** Der Salomonssiegel benötigt keinen Rückschnitt.

**Insekten** bienenfreundlich, heimische Wildstaude.

**Blühkalender**

	Mai	Juni	Juli	August	September
Weißer Sommer-Wald-Aster <i>Aster divaricatus</i>					
Blut-Storchschnabel <i>Geranium sanguineum</i>					
Gewöhnliche Akelei <i>Aquilegia vulgaris</i>					
Wald-Geißbart <i>Aruncus dioicus</i>					
Hängende Segge <i>Carex pendula</i>					
Salomonssiegel <i>Polygonatum multiflorum</i>					

**Bepflanzungsbeispiel**

